

De kennistoets kan online worden ingevuld en ingestuurd via de website www.nvtv.nl. In het linker menu bevindt zich de knop 'Kennistoets'. De correcte stellingen en het resultaat van de toets zijn direct te zien. Inzenders die minstens 7 van de 9 stellingen correct hebben gekozen, ontvangen per e-mail een op naam gesteld certificaat. Deze kennistoets is voorbehouden aan abonnees. Het Kwaliteits Register Tandartsen en het Kwaliteits Register Mondhygiënistten kennen 3 nascholingspunten toe per behaalde kennistoets.



De kennistoets wordt gegarandeerd door



de begeleidingscommissie

Q-keurmerk



Bij het artikel van Van Cann EM, Koole R. Spoedtracheotomie voor luchtwegobstructie na postoperatieve bloeding geassocieerd met gebruik van antidepressivum. *Ned Tijdschr Tandheelkd* 2009; 116: 544-54

- 1** Een serotonineheropnameremmer
 - a remt de heropname van serotonine in neuronen in het centrale zenuwstelsel en de opname van serotonine in erythrocyten.
 - b remt de opname van serotonine in neuronen in het centrale zenuwstelsel en de heropname van serotonine in trombocyten.
 - c remt de opname van serotonine in neuronen in het centrale zenuwstelsel en de heropname van serotonine in erythrocyten.
 - d remt de heropname van serotonine in neuronen in het centrale zenuwstelsel en de opname van serotonine in trombocyten.
- 2** Bij gelijktijdig gebruik van een serotonineheropnameremmer en een 'non-steroidal anti-inflammatory drug'
 - a bestaat een kleinere kans op abnormaal bloeden dan bij gebruik van alleen een serotonineheropnameremmer.
 - b wordt de serotonineconcentratie in trombocyten vergroot.
 - c ontstaat door de serotonineheropnameremmer een toxisch effect op de gastro-intestinale mucosa.
 - d moeten bij de extractie van een gebitselement additionele hemostatische maatregelen worden overwogen.
- 3** Bij gebruik van een serotonineheropnameremmer is
 - a de kans op een gastro-intestinale bloeding groter dan normaal.
 - b de tromboxaansynthese gereduceerd.
 - c de kans op een gastro-intestinale bloeding niet groter dan normaal.
 - d een toxisch effect op de gastro-intestinale mucosa een inherent gegeven.

Bij het artikel van Reinders JJ, Sorghabi W. Zeven instrumenten voor het me van behandelangst. *Betrouwbaarheid en convergente validiteit*. *Ned Tijdschr Tandheelkd* 2009; 116: 551-557

- 4** Uit onderzoek onder Nederlandse kinderen van 4-11 jaar is gebleken dat het percentage kinderen met een grote mate van angst voor tandheelkundige behandeling
 - a 20 is.
 - b 10 is.
 - c 6 is.
 - d te verwaarlozen is.

- 5** Tot de methoden die angst voor tandheelkundige behandeling bij kinderen meten, behoren
 - a gedragsobservatie en fysiologische metingen.
 - b gedragsobservatie en directe conditionering.
 - c directe conditionering en (zelf)rapportageschalen.
 - d (zelf)rapportageschalen en validiteitsmetingen.

- 6** De convergente validiteit van een diagnostische test geeft aan
 - a de mate van betrouwbaarheid van deze test en de mate van samenhang tussen deze test en een andere soortgelijke test.
 - b de mate van samenhang tussen deze test en een andere soortgelijke oorspronkelijke test.
 - c de mate van betrouwbaarheid van de gebruikte test.
 - d het verschil in betrouwbaarheid van deze test en van een andere soortgelijke oorspronkelijke test.

Bij het artikel van Visser A, Hoeksema AR, Baat C de, Vissink A. Zo en nazorg voor implantaten bij zorgafhankelijke patiënten. *Ned Tijdschr Tandheelkd* 2009; 116: 559-563

- 7** Door middel van onderzoek is aangetoond dat bij mensen van hoge leeftijd een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak
 - a beter niet kan worden toegepast.
 - b met veel succes kan worden toegepast.
 - c een weinig doelmatige behandeling is.
 - d altijd met veel succes kan worden toegepast.
- 8** Ten behoeve van de zorg voor zorgafhankelijke mensen zijn sinds het begin van deze eeuw van overheidswege
 - a voldoende middelen beschikbaar.
 - b de beschikbare middelen gereduceerd.
 - c iets meer middelen beschikbaar gesteld waardoor de verzorgende mankracht kon worden uitgebreid.
 - d de beschikbare middelen gereduceerd omdat de zorgvraag is afgenomen.

- 9** Indien voor zorgafhankelijke ouderen die een overkappingsprothese op implantaten hebben, op lange termijn geen goede mondverzorging kan worden gegarandeerd, dient men in geval van klachten te overwegen
 - a de implantaten te verwijderen.
 - b de overkappingsprothese niet meer te laten dragen.
 - c de mesostructuur te verwijderen en de implantaten te 'begraven'.
 - d alleen de mesostructuur en de overkappingsprothese te verwijderen.