

De kennistoets kan door abonnees online worden ingevuld en ingestuurd via de website [www.ntvt.nl](http://www.ntvt.nl). Direct na het inloggen komt de knop 'Maak een kennistoets' in beeld. De correcte stellingen en het resultaat van de toets zijn na afronding direct te zien. Inzenders die minstens 7 van de 9 stellingen correct hebben beantwoord, ontvangen per e-mail een op naam gesteld certificaat.



De kennistoets wordt gegarandeerd door de begeleidingscommissie Q-keurmerk

*Bij het artikel van Veldhuis SKB, Witjes MJH, Reintsema H, Roodenburg JLN, Schepman KP, Timmenga NM, Hem PS van der. Paresthesie van de wang door een osteosarcoom. Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 215-218.*

- 1 Een osteosarcoom is een
  - a benigne tumor en de aanwezigheid van osteoïd is het criterium voor de diagnose.
  - b maligne tumor van kraakbeenvormende cellen.
  - c maligne tumor en de aanwezigheid van osteoïd is het criterium voor de diagnose.
  - d maligne tumor van botvormende cellen en de aanwezigheid van osteoïd is het criterium voor de röntgenologische diagnose.
- 2 Osteosarcomen
  - a komen voornamelijk voor in de lange pijpbeenderen.
  - b hebben de schouderregio als voorkeurslocatie.
  - c hebben in Nederland een incidentie van ongeveer 4.000 per jaar.
  - d komen voornamelijk voor in de mandibula en de maxilla.
- 3 Patiënten met een osteosarcoom in het hoofd-halsgebied
  - a hebben pijn als meest frequente symptoom.
  - b presenteren zich meestal met een symmetrische zwelling van het aangezicht.
  - c hebben als eerste symptoom pijn en later ontstaat een zwelling.
  - d hebben soms paresthesie van een tak van de nervus trigeminus.

*Bij het artikel van Rimmelink HJ, Hoekema A. De 'Richtlijn Diagnostiek en behandeling van het obstructievelaapapneusyndroom bij volwassenen'. Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 227-231.*

- 4 Het obstructief slaapapneusyndroom
  - a treedt op tijdens de slaap als gevolg van afsluiting van de larynx.
  - b is een risicofactor voor hypotensie en cardiovasculaire aandoeningen.
  - c zorgt voor ontwaakreacties die worden gevolgd door een stadium van diepe slaap.
  - d leidt tot cognitieve problemen overdag.

- 5 Behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom door osteotomieën waarbij de boven- en de onderkaak naar ventraal worden verplaatst,
  - a is alleen effectief bij een lichte tot matige vorm van het obstructief slaapapneusyndroom.
  - b kan zorgen voor een verruiming van de trachea.
  - c is alleen effectief bij een obstructie dorsaal van het palatum molle.
  - d kan zorgen voor een verruiming van de bovenste luchtweg.
- 6 Behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom met een mandibulair repositieapparaat
  - a heeft hetzelfde effect als een behandeling met een orthodontische activator.
  - b heeft neveneffecten die doorgaans mild van aard zijn.
  - c zorgt voor positieve luchtdruk die apneus en hypopneus tegengaat.
  - d heeft niet het neveneffect dat gebitselementen kunnen worden verplaatst.

*Bij het artikel van Jacobs L, Rizvi SNF, Baart JA, Allard RHB. Interacties en bijwerkingen van 'non-steroidal anti-inflammatory drugs'. Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 233-237.*

- 7 Paracetamol
  - a heeft alleen een pijnstillende werking.
  - b is de pijnstillende keuze bij veel weefselschade.
  - c heeft geen koortsremmende werking.
  - d heeft geen ontstekingsremmende werking.
- 8 'Non-steroidal anti-inflammatory drugs' (NSAID's) kunnen
  - a de werking van antihypertensiva verminderen.
  - b in combinatie met ciclosporine misselijkheid en braken veroorzaken.
  - c in combinatie met cumarinderivaten het bloedingsrisico verkleinen.
  - d de werking van antihypertensiva versterken.
- 9 'Non-steroidal anti-inflammatory drugs' (NSAID's)
  - a kunnen al in een kleine dosis hartfalen verergeren.
  - b kunnen de vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden.
  - c doen in combinatie met lithium een verhoging van de lithiumconcentratie in het bloed ontstaan.
  - d veroorzaken in combinatie met selectieve serotonine heropnameremmers convulsies.