



## Kennistoets

De kennistoets is voorbehouden aan abonnees en kan online worden ingevuld en ingestuurd via de website [www.ntvt.nl](http://www.ntvt.nl). Direct na het inloggen komt de knop 'Maak een kennistoets' in beeld. De correcte stellingen en het resultaat van de toets zijn direct te zien. Inzenders die minstens 7 van de 9 stellingen correct hebben gekozen, ontvangen per e-mail een op naam gesteld certificaat.



*Bij het artikel van Rossum LGM van, Laheij RJF, Jansen JBMJ. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 263-267.*

- 1** De prevalentie van darmkanker is in Nederland
- onder mannen ongeveer even groot als onder vrouwen.
  - veel groter onder vrouwen dan onder mannen.
  - geen reden voor een groot gezondheidsprobleem.
  - veel groter onder mannen dan onder vrouwen.

- 2** Een coloscopie is
- de gouden standaard voor diagnostiek en primaire screening van darmkanker.
  - een kijkonderzoek voor het sigmoid en het rectum.
  - niet geschikt om adenomen uit de dikke darm te verwijderen.
  - pas goed mogelijk als de patiënt enkele liters laxeermiddel heeft gedronken.

- 3** Tijdens een sigmoidoscopie
- wordt alleen het sigmoid bekeken.
  - wordt relatief vaak darmkanker niet opgemerkt.
  - wordt het voorste deel van de darm bekeken.
  - zijn ook alle behandelingen mogelijk die tijdens een coloscopie mogelijk zijn.

*Bij het artikel van Voorsmit RACA. Proefschriften 25 jaar na dato 22. Chirurgische behandeling van keratocysten. Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 278-282.*

- 4** Een recidiverende keratocyste kan zich ontwikkelen als een
- echt recidief uit microcysten.
  - persisterende keratocyste uit epitheeilandjes.
  - cyste die als een nieuwe keratocyste ontstaat uit endothele extensies.
  - persisterende keratocyste uit microcysten.

- 5** Keratocysten
- hebben een erg dikke epitheliale bekleding.
  - die vóór enucleatie worden gefixeerd, kunnen gemakkelijk epitheliale cellen verspreiden.
  - hebben een grote kans op een recidief na chirurgische verwijdering.
  - kunnen door fixatie vóór enucleatie volledig worden gesepareerd van het onderliggende epitheel.

- 6** De gemodificeerde Carnoy's oplossing
- heeft onder andere als doel het fixeren van vitale epitheliale restcellen.
  - is samengesteld uit alcohol, chloroform en ijsazijnzuur.
  - dient voor enucleatie van een keratocyste minimaal 5 minuten de cystewand te fixeren.
  - heeft geen hemostatische werking.

*Bij het artikel van Kerbusch AEG, Kuijpers-Jagtman AM, Mulder J, van der Sanden WJM. Wittefleklaesies tijdens orthodontische behandeling: preventief beleid. Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 283-287.*

- 7** De toename van de kans op glazuurdemineralisatie gedurende een orthodontische behandeling is primair het gevolg van
- een verandering van de samenstelling van de plaque.
  - lokale plaqueretentie door de orthodontische apparatuur.
  - de bedekking van glazuur met brackets.
  - de toename van het aantal streptokokken mutans, vooral bij patiënten die nog niet eerder cariës hebben ontwikkeld.

- 8** Gedurende een orthodontische behandeling kan glazuurdemineralisatie vooral ontstaan op het
- incisale derde deel van het buccale vlak van de eerste premolaren in de onderkaak.
  - cervicale derde deel van het buccale vlak van de laterale incisieven in de bovenkaak.
  - cervicale derde deel van het buccale vlak van de cuspidaten in de bovenkaak.
  - middelste derde deel van het buccale vlak van de centrale incisieven in de onderkaak.

- 9** Het 'Advies Fluoride' adviseert bij patiënten met een verhoogd cariërisico, waartoe ook orthodontiepatiënten behoren, het aantal fluoridemomenten per dag te verhogen tot
- maximaal 4.
  - minimaal 3.
  - minimaal 4.
  - maximaal 3.