



## Kennistoets

De kennistoets is voorbehouden aan abonnees en kan online worden ingevuld en ingestuurd via de website [www.ntvt.nl](http://www.ntvt.nl). Direct na het inloggen komt de knop 'Maak een kennistoets' in beeld. De correcte stellingen en het resultaat van de toets zijn meteen te zien. Inzenders die minstens 7 van de 9 stellingen correct hebben gekozen, ontvangen per e-mail een op naam gesteld certificaat.



*Bij het artikel van Alons K, Bergé SJ, Rieu PNMA, Meijer GJ. Behandeling van macroglossie ten gevolge van acromegalie. Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 321-324.*

- 1** Absolute macroglossie
- a is een vergroting van de tong zelf.
  - b is een tong van normale grootte, waarvoor te weinig ruimte beschikbaar is.
  - c komt meestal voor bij een onderontwikkelde onderkaak.
  - d komt meestal voor bij een onderontwikkelde bovenkaak.

- 2** Macroglossie
- a moet na het stellen van de diagnose zo snel mogelijk worden behandeld.
  - b wordt gediagnosticeerd op basis van objectieve criteria.
  - c gaat vrijwel altijd gepaard met een grote neus.
  - d kan een anterieure open beet veroorzaken.

- 3** Bij het kiezen van een methode voor chirurgische behandeling van macroglossie
- a komt de V-vormige wigresectie uit de tongpunt veelal als eerste in aanmerking.
  - b dient men ook te denken aan suppletie van door de hypofyse geproduceerde hormonen.
  - c moet ook een verkleining van het cavum oris worden overwogen.
  - d moet tevoren goed worden bepaald waar de tong vergroot of verdikt is.

*Bij het artikel van Pas-van Voskuilen IGM van der, Veerkamp JSJ, Bresters D, Wijk AJ van, Gortzak RATH, Raber-Durlacher JE. Langetermijneffecten op de gebitsontwikkeling na stamceltransplantatie. Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 331-335.*

- 4** Chronische orale complicaties bij hematopoïetische stamceltransplantatie en de voorbehandeling met chemotherapie en eventuele totale lichaamsbestraling kunnen zijn:
- a agenesie en macrodontie.
  - b hypersalie en verstoringen in de craniofaciale groei.
  - c glazuurhypoplasie en vernauwing van de pulpakamer.
  - d versnelde eruptie van de blijvende en retentie van de tijdelijke gebitselementen.

- 5** Een oraal probleem dat zich als gevolg van hematopoïetische stamceltransplantatie en de voorbehandeling met chemotherapie en eventuele totale lichaamsbestraling kan voordoen, is
- a het ontstaan van parodontitis.
  - b toename van de speekselsecretiesnelheid.
  - c glazuurhyperplasie.
  - d het ontstaan van cariës.

- 6** De onderzoeksgroep had ten opzicht van de controlegroep een significant hogere prevalentie van agenesie van (A) premolaren in de maxilla en van (B) tweede molaren in de mandibula.
- a A en B zijn juist.
  - b A is juist en B is onjuist.
  - c A is onjuist en B is juist.
  - d A en B zijn onjuist.

*Bij het artikel van Wijs RW, Karssemakers LHE, Becking AG. Coronectomie. Alternatief voor volledige verwijdering van een derde molaar in de onderkaak. Ned Tijdschr Tandheelkd 2010; 117: 337-340.*

- 7** Een risicofactor voor het ontstaan van een sensibiliteitsstoornis na chirurgische verwijdering van een derde molaar in de onderkaak is een röntgenologisch waarneembare
- a verbreding van de radices van de derde molaar ter plaatse van de canalis mandibulae.
  - b relatie tussen de derde molaar en de canalis mandibulae.
  - c verbreding van de parodontale spleet van de radices van de derde molaar.
  - d brede canalis mandibulae.

- 8** Coronectomie van een derde molaar in de onderkaak
- a is een behandeling waarbij alleen het kroongedeelte wordt verwijderd.
  - b lijkt een zinvolle en veilige behandeling.
  - c is een goed alternatief voor wortelsplitsing.
  - d lijkt een goede behandeling om een sensibiliteitsstoornis in het verzorgingsgebied van de nervus lingualis te voorkomen.

- 9** Uit onderzoek is gebleken dat bij chirurgische verwijdering van derde molaren in de onderkaak de kans op blijvende uitval van de nervus alveolaris inferior
- a kleiner is dan 0,2%.
  - b groter is dan 10%.
  - c kleiner is dan 5%.
  - d groter is dan 20%.