



## Kennistoets

De kennistoets is voorbehouden aan abonnees en kan online worden ingevuld en ingestuurd via de website [www.ntvt.nl](http://www.ntvt.nl). Direct na het inloggen komt de knop 'Maak een kennistoets' in beeld. De correcte stellingen en het resultaat van de toets zijn meteen te zien. Inzenders die minstens 7 van de 9 stellingen correct hebben gekozen, ontvangen per e-mail een op naam gesteld certificaat.



De kennistoets wordt gegarandeerd door



de begeleidingscommissie



Q-keurmerk.

Bij het artikel van Veldink JH, Weikamp J, Schelhaas HJ, Berg LH van den. Amyotrofische laterale sclerose. *Ned Tijdschr Tandheelkd* 2010; 117: 380-382.

- 1** Amyotrofische laterale sclerose
    - a ontstaat doorgaans al op jonge leeftijd.
    - b heeft een vrijwel lineaire progressie.
    - c ontstaat door langzame destructie van sensibele zenuwcellen.
    - d is een direct agressief beginnende ziekte.
  - 2** Amyotrofische laterale sclerose is
    - a een erfelijke ziekte.
    - b vrij eenvoudig te diagnosticeren.
    - c een ziekte die na uitgebreide behandeling kan genezen.
    - d een multifactoriële ziekte.
  - 3** Problemen met spreken bij amyotrofische laterale sclerose kunnen
    - a ontstaan door een verhoogde vitale longcapaciteit.
    - b worden behandeld met een beademingsmasker ('continuous positive airway pressure').
    - c worden verminderd door logopedische behandeling.
    - d kunnen worden verlicht door middel van fysiotherapie.
- Bij het artikel van Dik EA, Es RJJ van, Bergsma JE. Een toxische reactie van de mondmucosa op orale bisfosfonaten. *Ned Tijdschr Tandheelkd* 2010; 117: 387-390.
- 4** Een ulcus van het mondslijmvlies kan een symptoom zijn van een auto-immuunafwijking als
    - a erosieve lichen planus en afte.
    - b pemphigus vulgaris, hyposialie en de ziekte van Crohn.
    - c de ziekte van Crohn, afte en systemische lupus erythematoses.
    - d pemphigus vulgaris.
  - 5** Bisfosfonaten zijn medicamenten
    - a tegen de ziekte van Crohn.
    - b die de werking van osteoblasten remmen.
    - c tegen verschillende vormen van osteoporose.
    - d tegen de ziekte van Paget.
  - 6** A. Alendroninezuur behoort tot de bisfosfonaten.  
B. Het gebruik van alendroninezuur heeft frequent orale ulcera als bijwerking.
    - a Stellingen A en B zijn juist.
    - b Stelling A is juist en stelling B is onjuist.
    - c Stelling A is onjuist en stelling B is juist.
    - d Stellingen A en B zijn onjuist.

Bij het artikel van Smit SHBJM, Baat P de, Schols JMGA, Baat C de. Vermijden van valincidenten van ouderen in mondzorgpraktijken. *Ned Tijdschr Tandheelkd* 2010; 117: 396-402.

- 7** A. Bij hypoperfusie wordt te weinig bloed in circulatie gebracht waardoor de perfusie van bloed in de organen tekortschiet.  
B. Orthostatische hypotensie is een daling van de bloeddruk binnen 2 uur na het nuttigen van een maaltijd.
  - a Stellingen A en B zijn juist.
  - b Stelling A is juist en stelling B is onjuist.
  - c Stelling A is onjuist en stelling B is juist.
  - d Stellingen A en B zijn onjuist.
- 8** Van de ouderen die een chirurgische behandeling vanwege een heupfractuur hebben ondergaan, is naar schatting op een termijn van 1 jaar ongeveer 50%
  - a nagenoeg ongestoord genezen en functioneel weer op het oude niveau.
  - b afhankelijk geworden van een rollator.
  - c afhankelijk geworden van een rolstoel.
  - d overleden als gevolg van comorbiditeit en/of complicaties.
- 9** Ter vermindering van de kans op vallen als gevolg van postprandiale hypotensie zijn voorkeurstijdstippen voor consulten of behandelingen van ouderen in een mondzorgpraktijk
  - a de tweede helft van de ochtend en de tweede helft van de middag.
  - b de tweede helft van de ochtend en de eerste helft van de middag.
  - c de eerste helft van de ochtend en de eerste helft van de middag.
  - d de eerste helft van de ochtend en de tweede helft van de middag.

