

## In cijfers

**5 stappen** De afdrukprocedure voor een edentate boven- en onderkaak bestaat uit 5 stappen: beginafdruk, beginmodel, individuele afdruklepel, definitieve afdruk en definitief model. Wanneer ergens in het stappenplan een tekortkoming ontstaat, heeft dat zijn repercussies voor de volgende stappen en kan het ertoe leiden dat de gebitsprothese onvoldoende stabiliteit en retentie heeft... *pag. 555*

**Circa 250** smaakknoppen zijn te vinden in elk van de grootste papillen met de meeste smaakbepalers, de papillae vallatae, die zich bevinden direct voor de sulcus terminalis linguae op een rij (4-13 bij de mens)... *pag. 569*

**69,7%** van de derde molaren toonde direct contact tussen de molaar en de nervus alveolaris inferior... *pag. 586*

## In citaten

*De vrouw was bij de ontdekking van de afwezigheid van de kroon van de incisief in paniek geraakt en ze wilde onmiddellijk een vervanging. Ze had de dag na de 'verdwijning' een lokaal mondzorgcentrum bezocht, maar door haar agressieve houding was geen behandeling uitgevoerd. De laatste 15 jaar had de patiënt perfect gefunctioneerd met een verkorte tandboog...*

[Lees meer op pag. 533](#)

*De meest confronterende en belastende behandelfase is het plaatsen van de immediate gebitsprothese. Voor de patiënt een spannende gebeurtenis, waarnaar veelal met enige vrees wordt uitgekeken...*

[Lees meer op pag. 542](#)

*Indien een relining of rebasing wordt overwogen, dient men niet alleen de kwaliteit van de gebitsprothese te beoordelen maar ook de klachten van de patiënt te inventariseren. Meestal zijn het immers de klachten van een patiënt die aanleiding geven om te onderzoeken of een relining of rebasing een mogelijke en zinvolle behandeloptie is. Het gaat daarbij veelal om klachten...*

[Lees meer op pag. 545](#)

*Reeds in het begin van de vorige eeuw werd uitgebreid stilgestaan bij de vraag waar de prothese-elementen van een volledige gebitsprothese precies moesten worden opgesteld. Vooral de opstelling van de prothese(pre)molaren leidde tot veel discussie. Men had al snel door dat 'blindelings' de opstelling van de dentitie imiteren niet de oplossing was...*

[Lees meer op pag. 563](#)

*Hoewel het percentage gebitsprothesedragers in Nederland is afgenomen, droeg in 2009 nog steeds de helft van de mensen van 50 jaar en ouder een volledige gebitsprothese. Een deel van deze groep heeft een probleemloze orale functie. Een grote groep heeft echter veel problemen met een volledige gebitsprothese in de onderkaak. De grootste klacht betreft de geringe mate van stabiliteit en retentie die een conventionele volledige gebitsprothese in de onderkaak te bieden heeft. Volgens de 'McGill consensus statement' zou een overkappingsprothese op 2 implantaten in de onderkaak de eerste keuze moeten zijn bij de behandeling van een edentate onderkaak...*

[Lees meer op pag. 577](#)



Reageren op een artikel?  
Mail naar: [redactielezerspost@ntvt.nl](mailto:redactielezerspost@ntvt.nl)