

KORTE MEDEDEELINGEN.

Tandvleesch-bloktanden worden, om het donkere doorschijnen der aan elkander geslepen blokken te voorkomen, aan den binnen- en buitenkant met dun aangemaakt cement bedekt; de buitenkant vóór het ingipsen in de cuvette, de binnenkant na het uitgieten van het was. Men neemt van den buitenkant het cement eerst af, nadat het stuk geheel afgewerkt is.

Drooghouden. Om bij het vullen de caviteiten zonder cofferdam droog te houden, plaatst men over den tand eene cofferdam-klem, die tevens linguaal en labiaal watten- of papierrollen vasthoudt.

Een zeer goed *pijnstillend middel bij periostitis* is twee maal binnen twee uren een half gram antifebrine te geven.

Bij het *cauteriseeren der pulpa* door middel van arsenicum kan de pijn geheel vermeden worden. Men legt over de geappliceerde pasta een kapje van metaal, zoodat er in 't geheel geen druk op de pulpa wordt uitgeoefend. Over het kapje vult men dan de holte met mastix, was, getah percha of cement. De arsenikpasta make men steeds versch uit gelijke deelen ac. arsenicosum, cocaïne en ac. carbolicum.

De kapjes kan men uit zeer dun geplet nieuwzilver, platina of goud knippen en met een kogelstopper op een stukje lood vormen. De in de dépôts aanwezige vormen zijn niet in alle gevallen bruikbaar.



