

KORTE MEDEDEELINGEN.

Om in ontoegankelijke kanalen de pulpa te verdooven. wordt aanbevolen een mengsel van gelijke deelen tannine, creosoot en nagelolie.

Ontsmetting van instrumenten. Boro-glycerine met zinksulfaat is een goed ontsmettingsmiddel, hetwelk de instrumenten niet aantast, bovendien voor de patiënten en voor hunne tanden onschadelijk is.

Reinigingsmiddel voor de handen. Voeg bij een half pond boraxpoeder, een pond koolzure natron en een half pond fijn puimsteenpoeder, en zooveel glycerine als noodig is om het mengsel dikvloeibaar te maken. Dit kan in plaats van zeep voor het reinigen en blank houden der handen worden gebruikt.

Matrix voor cementvullingen. Een uitstekende matrix voor zijdelingsche cementvullingen maakt men van celluloid; men laat dit ter plaatse zoolang tot het cement volkomen hard is, en vindt dan eene prachtig gepolijste oppervlakte.

Langzaam hard worden. In vele gevallen is het wenschelijk, dat het cement niet te spoedig hard wordt; men verkrijgt deze eigenschap door bij het cementpoeder een zeer kleine hoeveelheid fijn boraxpoeder te voegen. Wenscht men een *snel* hard worden van het cement, zoo voege men daarbij een klein deel van een droppel zoutzuur.

Cementvullingen in proximale caviteiten. Onze oxyphosphaten zijn nooit te vertrouwen in proximale holten. Meer betrouwbaar kunnen zij worden gemaakt door tegen den cervicalen rand gutta-percha te brengen. Voor teere jonge tanden en in 't algemeen voor zeer brooze tanden, ook van volwassenen, is deze vullingsmethode aan te bevelen.

Verwijdering van gips. Dikwijls blijven gipsresten hardnekkig aan de ge vulcaniseerde platen kleven; men kan deze gemakkelijk verwijderen, wanneer men de plaat vijf minuten in zoutzuur dompelt.

Om roode caoutchouc-platen aan den binnenkant van zwarten caoutchouc te voorzien, bestrijke men het model — nadat het van was gereinigd is — drie of viermaal met eene oplossing van zwarten caoutchouc; elke laag moet droog zijn, alvorens de volgende wordt aangebracht; daarna wordt met rooden caoutchouc op de gewone wijze gestopt.

Overkapping van geamputeerde pulpae. Breng op den blootliggenden pulpawortel een in 30% formaline-oplossing gedompeld gecarboliseerd watje. Na 24 uren is de oppervlakte gecauteriseerd, donker en hard, en toch elastisch; hierop kan de vulling worden gebracht.

Gecombineerde goudvulling. Een deel cohesieve en twee deelen noncohesieve foelie samen gevouwen, en gebruikt als noncohesief goud, geeft eene vulling die beter aansluit dan volgens elke andere methode, en ook sneller gereed is; het cohesieve goud moet zich aan den buitenkant bevinden.

Pijnlooze devitalisatie. Men gebruike hiertoe een mengsel van gelijke deelen arsenicum en tannine, goed gemengd met eene verzadigde oplossing van cocaine in carbolzuur. Alvorens de pulpa te verwijderen, brengt men cocaine en carbolzuur in het kanaal, en wel tot aan den apex. Hierdoor worden pijn en bloeding tegengegaan.

Reinigen van afdruklepels. Wrijf deze in met olie en kook ze daarna uit in sterk zeepwater. Dan kunnen ze gepoetst worden met krijt.

Overkapping met Salol. Verwijder zooveel mogelijk het verweekte tandbeenweefsel, verzadig den bodem der holte met kaneelolie; vul een platinakapje met een mengsel van phenylzuur, zinkoxyde en vaseline, en plaats dit op de blootliggende pulpa. Breng op het kapje eenige kristallen salol, en laat deze overvloeien met een verwarmden polijster; hierdoor verkrijgt men eene hermetische afsluiting.

Wortelvulling met was. Na reiniging van het kanaal en uitdroging met een heete naald, bringe men een weinig gele was in het kanaal en laat het daar smelten door het inbrengen van een passend verwarmd instrument. Met behulp van een opgerolde wat kan de was tot in den apex gedrongen worden. Dit is een goede blijvende vulling, die niet schrompelt noch bederft, en zelfs zonder gevaar door het foramen kan worden geperst.

Vullen van Melktanden. Als een goede voorbereiding der holte niet mogelijk is, wordt het weeke dentine met zilvernitraat bestreken, en de holte met oxyphosphaatcement gevuld. De vulling kan later vernieuwd worden; het excaveeren veroorzaakt dan weinig of geen pijn.

Voor gevoelige dentine is zilvernitraat nog steeds het beste middel. In den regel wordt één dag na aanwending van dit middel geopereerd. Maar het is beter dit te doen *een half uur* na de aanwending. Het beste is eene versche verzadigde oplossing van het zout; de vooraf klaargemaakte preparaten verliezen spoedig hun cauteriseerend vermogen.

Items of Interest.

Corpus alienum. Eene vrouw te Elisabeth (N.-Y.) heeft een verstandskies opgehoest, die tijdens de extractie (onder lachgasnarcose) verdwenen was, en drie maanden in een bronchus gehuisd had.

Weekblad Tijdschrift voor Geneeskunde.

Dr. JOHNSON van de *Dental Review* schrijft:

„Besmeer uw schuurpapierschijfjes en repen met vaseline of olie. Dit voorkomt pijn door vermindering van de bij de wrijving onstane warmte. De schijfjes worden buigzamer, zoodat men ze gemakkelijker tegen een gegeven punt kan drukken en de fijne gouddeeltjes blijven aan de oppervlakte hangen; de tandarts, die zijn oude schijfjes bewaart en ze naar den essayeur stuurt, zal verbaasd zijn over het gevolg”. Wij kunnen dezen raad niet dan onderschrijven; echter houden wij het er voor dat men met voordeel de olie door glycerine kan vervangen. Vóór het gebruik doet men een druppeltje op het schijfje.

(*Revue Odontologique.*)

(*Dental Record.*)

