

KORTE MEDEDEELINGEN.

Separeren. H. H. GANTZ gebruikt voor het separeren van tanden kleine stukjes zeewier, hetwelk stevig in de caviteiten tusschen de tanden wordt gestopt. Dit is veel beter dan elastiek en veroorzaakt niet zulk een pijnlijke aandoening van gingiva en periost.

Pyorrhoea. Door proeven, genomen aan de „John Hopkins” Universiteit, is gebleken, dat etter-culturen op glas terstond gestriliseerd worden wanneer zij met zilver in aanraking komen. Hierdoor is men op de gedachte gekomen om door pyorrhoea aangetaste wortels te omgeven met een ring van zuiver zilver, diep onder het tandvleesch gaande, en met cement bevestigd. De resultaten waren over 't algemeen goed, de ettervloed verminderde in zeer korten tijd, ook dan wanneer de bandjes gemaakt waren van 20 kar. goud, uitsluitend met zilver gelegeerd. *Register.*

Plaatselijke verdooving. Een 10 % oplossing van cocaine, op watjes in de neusgaten gebracht, en daar 10 minuten verblijvende, heeft zulk een verdoovenden invloed op de zenuwen der snijtanden, dat deze bijna geheel pijnloos kunnen worden geëxtraheerd of geëxcaveerd. In dit geval wordt de zenuw gevoelloos gemaakt vóór zijne intrede in den tand.

Pijn na extractie. Één droppel eener 1 % oplossing van nitroglycerine in een half glas water genomen na extractie, is een krachtig en betrouwbaar middel, en ook van duurzame werking. Ook bij neuralgieën en hoofdpijn tengevolge van langdurige tandoperaties heeft dit middel veel waarde.

Soldeeren. Bij het soldeeren wordt aangeraden in plaats van houtskool, puimsteen te gebruiken, die geen schadelijken damp afgeeft en ook niet spat.

Kronen. Alvorens de kroon te plaatsen, bestrijke men het tandvleesch rondom met eene oplossing van chloorijzer, hetwelk het uitzweeten van vocht tegengaat, zoodat het cement tijd heeft om hard te worden.

Eigengemaakte Afvalhouder. Neem een cilinderglas met metalen schroefsluiting; boor eene opening in het midden, en zaag volgens vooraf getrokken lijnen het overtollige metaal weg.

Items of Interest.

Bloktanden. Om te voorkomen dat de verbindingslijn tusschen blokken te veel zichtbaar wordt, neme men de goed aangeslepen blokken uit het gereed zijnde wasmodel, en bestrijke de voegen met een weinig dunne oxyfosfaatcement. Daarna worden de blokken weer op hun plaats gebracht en van het overtollige cement bevrijd

Dental Office and Laboratory.

Plaatselijke verdooving. In de first district Dental Society te New-York behandelde Dr. GENESE een eerste molaris van de benedenkaak; overkapping en vulling werd in ééne zitting verricht. De holte was zeer groot en het tandbeen buitengewoon gevoelig. Hierbij demonstreerde Dr. G. de pijnstillende eigenschappen van carbolas cocaini, verkregen volgens de formule:

Rp. Cocain.	4.
Ac. carbol.	50.
Benzoë.	50. *)

Onder aanwending van dit middel geschiedde het excaveeren zonder pijn.

Cosmos.

Phosphor-olie. Dit is een uitmuntend geneesmiddel bij periostitis als een gevolg van gecariëerde tanden. Na de holte te hebben gereinigd en gedroogd, wordt een watje bevochtigd met deze olie ingebracht en door gutta percha afgesloten. Binnen enkele minuten vermindert de pijn. Zelfs kan een aldus behandelde tand dagen en weken lang met rust worden gelaten. Hoe de pijnstillende werking te verklaren, is niet bekend, maar Dr. ALBRECHT meent dat deze moet worden toegeschreven aan de vetachtige degeneratie van het weefsel, waarmede de phosphorus in aanraking komt. De olie wordt bereid door één deel droge phosphorus op te lossen in acht deelen amandelolie, onder verwarming. **)

Dental Office and Laboratory.

*) In het oorspronkelijke staat: Gum benzoin, d. i. Benzoëhars.

**) Het is ref. niet gelukt eene zóó sterke oplossing te verkrijgen.



PERSONALIA.

Gevestigd: te Haarlem Mejuffrouw SOPHIA F. M. MOREL.

„ „ Rotterdam Dr. F. WESTERMAN Arts, speciaal voor mond- en tandziekten.

„ „ Gulpen (Limburg) JOSFPH SMEETS.

Tot Tandmeester bevorderd: de HH. M. DE BOER, L. FRANK en S. DE BOER.