

Bijlage 1. Resultaten subanalyses van het niveau van de mondgezondheid en mondverzorging van patiënten met het syndroom van Sjögren met of zonder reumatoïde artritis

Tabel A. De mondverzorging van Sjögrenpatiënten zonder versus met reumatoïde artritis

	Sjögrenpatiënten met zonder reumatoïde artritis (n ₁ = 34) n (%)	Sjögrenpatiënten met reumatoïde artritis (n ₂ = 16) n (%)	p*
Bezoek tandarts			0,765
Nooit	0 (00,00)	1 (6,25)	
Bij klachten	1 (02,94)	1 (6,25)	
Per 12 maanden	2 (05,88)	1 (6,25)	
Per 9 maanden	2 (05,88)	1 (6,25)	
Per 6 maanden	24 (70,00)	10 (62,5)	
Per 4 maanden	1 (02,94)	1 (6,25)	
Per 3 maanden	4 (11,76)	1 (6,25)	
Bezoek mondhygiënist			0,306
Nooit	12 (35,29)	5 (31,25)	
Bij klachten	0 (00,00)	0 (0,00)	
Per 12 maanden	1 (02,94)	1 (6,25)	
Per 9 maanden	0 (00,00)	0 (0,00)	
Per 6 maanden	19 (55,88)	7 (43,75)	
Per 4 maanden	1 (02,94)	0 (0,00)	
Per 3 maanden	1 (02,94)	3 (18,75)	
Soort tandenborstel			0,419
Manueel	17 (50,00)	8 (50,00)	
Manueel	8 (23,53)	6 (37,50)	
Beide	9 (26,47)	2 (12,50)	
Frequentie poetsen			0,659
Eenmaal daags	1 (02,94)	2 (12,50)	
Tweemaal daags	25 (73,53)	11 (68,75)	
Driemaal daags	7 (20,59)	3 (18,75)	
Viermaal daags	1 (02,94)	0 (00,00)	
Fluoride in tandpasta			1,000
Geen idee	5 (14,70)	2 (12,50)	
Bewust zonder	0 (00,00)	0 (00,00)	
Onbewust zonder	11 (02,94)	0 (00,00)	
Onbewust met	4 (11,76)	2 (12,50)	
Bewust met	24 (70,59)	12 (75,00)	
Interdentale reiniging			0,254
Geen	4 (11,76)	0 (00,00)	
Als er iets tussen zit	3 (08,82)	0 (00,00)	
Wekelijks	1 (02,94)	2 (12,50)	
Om de dag	2 (05,88)	3 (18,75)	
Dagelijks	15 (44,11)	8 (50,00)	
Vaker dagelijks	9 (26,47)	3 (18,75)	
Mondspoeling gebruik			0,691
Geen	21 (61,76)	9 (56,25)	
Eigen initiatief	6 (17,65)	2 (12,50)	
Advies van professional	7 (20,59)	5 (31,25)	
Tongreiniging			0,018
Nooit	23 (67,65)	4 (25,00)	
Wekelijks	2 (05,88)	4 (25,00)	
Bij niet gevoelige tong	1 (02,94)	0 (00,00)	
Dagelijks	5 (14,70)	5 (31,25)	
Tweemaal daags	3 (08,82)	2 (12,50)	
Driemaal daags	0 (00,00)	1 (06,25)	

*p-waarde bij vergelijking van de onderzoeksgroep met de controlegroep: Fisher's exact toets

Tabel B. De mondgezondheid van Sjögrenpatiënten zonder versus met reumatoïde artritis

	Sjögrenpatiënten zonder reumatoïde artritis (n ₁ = 34) m ± sd	Sjögrenpatiënten met reumatoïde artritis (n ₂ = 16) m ± sd	p*
Totale DMFS-index	42,1 ± 22,9	50,4 ± 15,9	0,176
Aantal missende gebitselementen, per gebitselement	3,2 ± 4,2	5,1 ± 4,7	0,097
Aantal implantaten, per gebitselement	0,2 ± 1,2	0,7 ± 1,4	0,020
Occlusale cariës en/of restauraties, per vlak	7,4 ± 4,1	6,5 ± 4,4	0,446
Interdentale cariës en/of restauraties, per vlak	12,8 ± 8,1	14,6 ± 9,7	0,553
Cervicale cariës en/of restauraties, per vlak	2,5 ± 3,4	2,6 ± 4,6	0,709
Aantal kronen, per gebitselement	3,3 ± 3,9	4,2 ± 4,2	0,402
	n (%)	n (%)	p**
Gegeneraliseerde cervicale aantasting			
Niet aanwezig	23 (67,65)	12 (075,00)	0,746
Wel aanwezig	11 (32,35)	4 (025,00)	
DPSI-score			
0	0 (00,00)	0 (000,00)	
1	5 (14,70)	3 (018,75)	
2	8 (52,94)	3 (018,75)	
3-	17 (50,00)	7 (043,75)	
3+	0 (00,00)	0 (000,00)	
4	7 (20,59)	3 (018,75)	
Partiële plaatprothese en/of frameprothese			0,584
Niet aanwezig	32 (94,12)	14 (087,50)	
Wel aanwezig	3 (05,88)	2 (012,50)	
Volledige gebitsprothese boven- of onderkaak			1,000
Niet aanwezig	33 (97,06)	16 (100,00)	
Wel aanwezig	1 (00,94)	0 (000,00)	

* p-waarde bij vergelijking van de onderzoeksgroep met de controlegroep: Mann Whitney U-toets

** p-waarde bij vergelijking van de onderzoeksgroep met de controlegroep: Fisher's exact toets