

In cijfers

6,8 mm was het radiologisch gemeten gemiddelde botverlies van de experimentele groep, die bestond uit patiënten die binnen 2 tot 24 maanden na een implantaatbehandeling peri-implantitis hadden ontwikkeld. In de controlegroep, die na 1 jaar geen peri-implantitis hadden ontwikkeld ($p < 0,01$), was dit 2,8 mm. Ook vonden de onderzoekers in de experimentele groep meer en grotere angulaire botdefecten op de postoperatieve panoramische röntgenopnamen dan in de controlegroep. In de experimentele groep werden angulaire botdefecten bij 42 implantaten gevonden en in de controlegroep bij 11 implantaten, met een gemiddelde diepte van 3,9 mm versus 1,8 mm ($p < 0,01$)... [pag. 125](#)

3,5 was het gemiddelde aantal correcte reacties van tandartsen op 19 stellingen waarmee hun kennis van tuberculose werd gemeten, een waarde die vergelijkbaar is met de raadkans (≈ 3). Ook bleek in de onderzoekspopulatie het kennisniveau niet uit te maken tussen de tandartsen zonder expliciete medische interesse (groep 1) en de tandartsen die medische nascholing volgden (groep 2). Verder bleek het kennisniveau van mannen en vrouwen vergelijkbaar,... [pag. 142](#)

In citaten

“Werken als vrijwilliger is meestal intens bevredigend, maar al in de jaren '60 van de vorige eeuw rezen bezorgde vragen over het nut van dit werk en de mogelijke negatieve effecten ervan op de ontvangende samenleving. Recentere auteurs vroegen zich zelfs af of vrijwilligersorganisaties op medisch gebied met hun acties niet meer kwaad dan goed deden. Een van de kritiepunten was het ontbreken van voldoende nazorg...”

[Lees meer op pag. 115](#)

“Tijdens de anamnese vertelde de patiënt dat hij 3 dagen eerder een te hete kaassoufflé had gegeten. Hierdoor had hij zijn mond verbrand. Na 2 dagen had de patiënt een dermate grote bloedblaar op zijn palatum dat hij bijna niet meer kon spreken. De patiënt had deze bloedblaar doorgeprikt met een schroevendraaier en had geprobeerd de restanten van de blaar weg te snijden met een stanleymes...”

[Lees meer op pag. 120](#)

“De individuele variatie was aanzienlijk, maar de onderhoudskosten van overkappingsprothesen over een periode van 10 jaar werden op € 1.400,00 geschat. Ter vergelijking: een conventionele gebitsprothese in de onderkaak die over een periode van 10 jaar dagelijks wordt vastgezet met een kleefmiddel en die in die periode 3 keer wordt gerelined, kost € 1.460,00. ... De vervaardigingskosten ervan zijn echter ongeveer de helft van die van een overkappingsprothese op implantaten...”

[Lees meer op pag. 135](#)

“De Vibraject® is een klein apparaat dat op een bestaande injectienaaldhouder kan worden geplaatst. Het apparaat kan een trilling overbrengen naar de naald en op deze manier de zenuw stimuleren en pijnsignalen onderdrukken. Het doel van dit onderzoek was de effectiviteit van de Vibraject® te evalueren op waargenomen pijn en pijngeassocieerd negatief gedrag bij kinderen tijdens het toedienen van lokale anesthesie...”

[Lees meer op pag. 146](#)



Ook reageren?

Mail naar: redactielezerspost@ntvt.nl